



VOTRE ANIMAL
SOUFFRE
D'ÉPILEPSIE ?

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR
QUAND LE TRAITER

QUAND DEVRIEZ-VOUS
DONNER UN
TRAITEMENT ?



Il est recommandé de mettre un animal sous traitement antiépileptique dans les cas suivants :




Dès l'apparition de **2 crises** en moins de **6 mois**



Dès la **première crise** chez les **rares fortement prédisposées** à des formes d'épilepsie sévères et souvent difficiles à contrôler :

Berger Australien, Labrador Retriever, Border Collie, Lagotto Romagnolo, Cane Corso, Lévrier Irlandais, Cavalier King Charles, Petit Basset Griffon Vendéen



Dès l'apparition de **crises groupées** ou **status epilepticus**

Crises groupées
Aussi appelées Clusters ou Crises en série



= 2 crises ou plus en 24 heures


Status epilepticus
Aussi appelé Etat de mal épileptique



= Crises > à 5 min ou plusieurs crises qui s'enchaînent



Si l'animal souffre de **somnolence**, de **confusion**, de **nausées** et d'autres **symptômes désorientants** (dans les 24 à 48 heures suivant la crise) ou est **particulièrement agressif** envers vous.



En cas de présence d'une **lésion cérébrale** (tumeur, inflammation...) visible par examens d'imagerie médicale ou objectivable par ponction de liquide céphalo-rachidien.



SOYEZ VIGILANT ET INFORMEZ VOTRE VÉTÉRINAIRE SI LA FRÉQUENCE OU L'INTENSITÉ DES CRISES AUGMENTE.



MON ANIMAL
EPILEPTIQUE
www.mon-animal-epileptique.fr



DÔMES
PHARMA